

## Sensibilité des pathogènes GRAM NÉGATIF au CHRDL\*

### 2012-2013

| Antibiotique    | <i>E.Coli</i><br>(n=1081) | <i>P.mirabilis</i><br>(n=91) | <i>Klebsiella sp</i><br>(n=244) | <i>Enterobacter sp</i><br>(n=83) | <i>Citrobacter sp</i><br>(n=25) | <i>Serratia sp</i><br>(n=25) | <i>Proteus /Morgan. / Provid. sp</i><br>(n=27) | <i>P. aeruginosa</i><br>(n=119) | <i>S.maltophilia</i><br>(n=47) |
|-----------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------|--|---------------------------------|--------------------------------|
| AMPICILLINE     | 62%                       | 86%                          | 0%                              | 0%                               | 0%                              | 0%                           | 0%   | 0%                              |                                |
| PIPERACILLINE   |                           |                              |                                 |                                  |                                 |                              |  |                                 | 97%                            |
| CEFAZOLINE      | 61%                       | 63%                          | 5%                              | 0%                               | 4%                              | 0%                           | 0%   | 0%                              | 0%                             |
| CEFOTAXIME      | 96%                       | 95%                          | 100%                            | 82%                              | 83%                             | 100%                         | 96%  | 0%                              |                                |
| CEFTAZIDIME     |                           |                              |                                 |                                  |                                 |                              |  |                                 | 99%                            |
| ERTAPENEM       | 100%                      | 100%                         | 100%                            | 94%                              | 96%                             | 100%                         | 100%   | 0%                              |                                |
| IMIPENEM        | 100%                      |                              | 100%                            | 99%                              | 100%                            | 100%                         |  | 88%                             |                                |
| GENTAMICINE     | 96%                       | 89%                          | 99%                             | 98%                              | 100%                            | 100%                         | 96%  | 96%                             |                                |
| TOBRAMYCINE     |                           |                              |                                 |                                  |                                 |                              |  |                                 | 98%                            |
| TRIMETHO+SULFA. | 82%                       | 80%                          | 97%                             | 94%                              | 96%                             | 100%                         | 93%  |                                 | 87%                            |
| CIPROFLOXACINE  | 87%                       | 98%                          | 96%                             | 96%                              | 96%                             | 100%                         | 93%  | 93%                             |                                |
| FURANES         | 95%                       | 0%                           | 36%                             | 29%                              | 63%                             | 0%                           | 0%   |                                 |                                |

Pathogènes isolés d'échantillons de tout site prélevés chez des patients au CHRDL\* (1 souche/pt/an)

\* CHRDL = Unités de l'aile A, USI, Urgence, Hémodialyse, SOP/CDJ et Endoscopie

Maryse Cayouette, MD, FRCP(C)

Microbiologiste-infectiologue

## Sensibilité des pathogènes GRAM NÉGATIF en externe/hébergement\* 2012-2013

| Antibiotique    | <i>E.Coli</i><br>(n=1499) | <i>P.mirabilis</i><br>(n=102) | <i>Klebsiella sp</i><br>(n=259) | <i>Enterobaceter sp</i><br>(n=49) | <i>Citrobacter sp</i><br>(n=44) | <i>Serratia sp</i><br>(n=17) | <i>Proteus /Morgan. / P. aeruginosa</i><br><i>Provid. sp</i> (n=30) | <i>S.maltophilia</i><br>(n=108) | <i>S.maltophilia</i><br>(n=19) |
|-----------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---|---------------------------------|--------------------------------|
| AMPICILLINE     | 63%                       | 86%                           | 0%                              | 0%                                | 0%                              | 0%                           | 0%  | 0%                              | 0%                             |
| PIPERACILLINE   |                           |                               |                                 |                                   |                                 |                              |   |                                 | 95%                            |
| CEFAZOLINE      | 63%                       | 69%                           | 4%                              | 0%                                | 0%                              | 0%                           | 0%  |                                 |                                |
| CEFOTAXIME      | 96%                       | 94%                           | 98%                             | 91%                               | 98%                             | 86%                          | 100%  |                                 |                                |
| CEFTAZIDIME     |                           |                               |                                 |                                   |                                 |                              |   |                                 | 98%                            |
| ERTAPENEM       | 100%                      | 99%                           | 100%                            | 96%                               | 100%                            | 100%                         | 100%  |                                 |                                |
| IMIPENEM        | 100%                      | 88%                           | 100%                            | 96%                               | 100%                            | 100%                         | 17%   |                                 | 87%                            |
| GENTAMICINE     | 94%                       | 93%                           | 98%                             | 100%                              | 95%                             | 100%                         | 97%   |                                 | 93%                            |
| TOBRAMYCINE     |                           |                               |                                 |                                   |                                 |                              |   |                                 | 97%                            |
| TRIMETHO+SULFA. | 80%                       | 95%                           | 95%                             | 96%                               | 91%                             | 94%                          | 90%   |                                 | 95%                            |
| CIPROFLOXACINE  | 86%                       | 98%                           | 96%                             | 100%                              | 95%                             | 94%                          | 97%   |                                 | 92%                            |
| FURANES         | 94%                       | 0%                            | 34%                             | 31%                               | 79%                             | 6%                           | 0%  |                                 |                                |

Pathogènes isolés d'échantillons de tout site prélevés en externe/hébergement\* (1 souche/pt/an)

\* Externe/hébergement = Unités ailes BCD du CHRDL et prélèvements hors CHRDL

Maryse Cayouette, MD, FRCP(C)

Microbiologiste-infectiologue

## Sensibilité des pathogènes GRAM POSITIF au CHRDL\*

### 2012-2013

| Antibiotique      | <i>S.aureus</i><br>n=232 | Staph. Coag-<br>n=138 | Strepto. Gr. A<br>n=159 | Strepto. Gr. B<br>n=52 | Pneumocoque<br>n=78 | Entérocoque<br>n=304 |
|-------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|
| PENICILLINE G     | 20%                      | 19%                   |                         |                        | 74%                 |                      |
| CMI PENI < 4 mg/L |                          |                       |                         |                        | 100%                |                      |
| AMPICILLINE       |                          |                       |                         |                        |                     | 81%                  |
| OXACILLINE        | 91%                      | 49%                   |                         |                        |                     |                      |
| ERYTHROMYCINE     | 70%                      | 49%                   | 92%                     | 77%                    | 67%                 |                      |
| CLINDAMYCINE      | 76%                      | 67%                   | 92%                     | 81%                    | 33%                 |                      |
| FURANES           | 100%                     | 99%                   |                         |                        |                     | 80%                  |
| TRIMETHO+SULFA.   | 100%                     | 64%                   |                         |                        | 87%                 |                      |
| VANCOMYCINE       | 100%                     | 99%                   |                         |                        | 100%                | 100%                 |
| LINEZOLIDE        | 100%                     | 100%                  |                         |                        |                     |                      |
| MUPIROCINE        | 100%                     | 69%                   |                         |                        |                     |                      |
| MOXIFLOXACINE     |                          |                       |                         |                        | 100%                |                      |
| CIPROFLOXACINE    |                          |                       |                         |                        |                     | 35%                  |

Pathogènes isolés d'échantillons de tout site, excluant les dépistages SARM/ERV\* (1 souche/pt/an)

\* CHRDL = Unités aile A, USI, urgence, endoscopie, hémodialyse, SOP/CDJ

Maryse Cayouette, MD, FRCP(C)

Microbiologiste-infectiologue

## Sensibilité des pathogènes GRAM POSITIF en externe/hébergement\* 2012-2013

| <b>Antibiotique</b> | <i>S.aureus</i><br><b>n=237</b> | Staph. Coag-<br><b>n=45</b> | Strepto. Gr. A<br><b>n=334</b> | Strepto. Gr. B<br><b>n=180</b> | Pneumocoque<br><b>n=26</b> | Entérocoque<br><b>n=263</b> |
|---------------------|---------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| PENICILLINE G       | 22%                             | 40%                         |                                |                                | 85%                        |                             |
| CMI PENI < 4 mg/L   |                                 |                             |                                |                                | 100%                       |                             |
| AMPICILLINE         |                                 |                             |                                |                                |                            | 96%                         |
| OXACILLINE          | 85%                             | 73%                         |                                |                                |                            |                             |
| ERYTHROMYCINE       | 69%                             | 53%                         | 94%                            | 77%                            | 69%                        |                             |
| CLINDAMYCINE        | 76%                             | 67%                         | 93%                            | 81%                            |                            |                             |
| FURANES             | 100%                            | 96%                         |                                |                                |                            | 95%                         |
| TRIMETHO+SULFA.     | 100%                            | 69%                         |                                |                                | 88%                        |                             |
| VANCOMYCINE         | 100%                            | 100%                        |                                |                                | 100%                       | 100%                        |
| LINEZOLIDE          | 100%                            | 100%                        |                                |                                |                            |                             |
| MUPIROCINE          | 98%                             | 69%                         |                                |                                |                            |                             |
| MOXIFLOXACINE       |                                 |                             |                                |                                | 100%                       |                             |
| CIPROFLOXACINE      |                                 |                             |                                |                                |                            | 46%                         |

Pathogènes isolés d'échantillons de tout site, excluant les dépistages SARM/ERV\* (1 souche/pt/an)

\* Externe/hébergement = Unités ailes BCD du CHRDL et prélèvements hors CHRDL

Maryse Cayouette, MD, FRCP(C)

Microbiologiste-infectiologue