

## ORDONNANCE COLLECTIVE

### INITIER UN TRAITEMENT CHEZ LES ENFANTS PRÉSENTANT DES SIGNES ET DES SYMPTÔMES SUGGESTIFS D'OTITE MOYENNE AIGUË (OMA)

Établissement : GMF des Affluents

Numéro de l'ordonnance collective : OC # 7

Période de validité : 3 ans (Avril 2027)

#### SITUATION CLINIQUE

Enfant âgé de 3 mois à 17 ans présentant des signes et des symptômes suggérant une otite moyenne aiguë (OMA) :

- Début récent et habituellement abrupt, de signes et symptômes;
- Présence des deux points suivants :
  1. Un épanchement mucopurulent dans l'oreille moyenne se manifestant par au moins un des éléments suivants :
    - Bombement de la membrane tympanique;  
OU
    - Membrane tympanique colorée et opaque;  
OU
    - Otorrhée non due à une otite externe;  
OU
    - Mobilité absente ou limitée de la membrane tympanique.

ET

2. Une inflammation de l'oreille moyenne qui se manifeste par au moins un des éléments suivants :
  - Érythème marqué de la membrane tympanique;  
OU
  - Otalgie (douleur dont l'intensité interfère avec les activités normales ou le sommeil).

#### ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES VISÉES

Activités réservées de l'infirmière :

- Évaluer la condition physique et mentale d'une personne symptomatique;
- Initier des mesures diagnostiques et thérapeutiques, selon une ordonnance;
- Exercer la surveillance clinique de la condition des personnes dont l'état de santé présente des risques, incluant le monitoring et les ajustements du plan thérapeutique infirmier;
- Effectuer et ajuster les traitements médicaux, selon une ordonnance.

#### PROFESSIONNELS AUTORISÉS

Infirmières travaillant dans les secteurs de la première ligne où le service est offert (ex. : GMF-U, GMF intra-muros, GMF extra-muros, GAP, etc.), qui possèdent la formation (théorie et pratique), les connaissances et les compétences nécessaires.

## INDICATIONS

Aucune indication additionnelle.

## INTENTION OU CIBLE THÉRAPEUTIQUE

Confirmer et traiter une OMA.

## CONTRE-INDICATIONS

- Enfant âgé de moins de 3 mois;
- Atteinte importante de l'état général;
- OMA légère avec otorrhée chez un enfant qui a des tubes de ventilation;
- Suspicion de méningite (raideur de la nuque, céphalée, fièvre, trouble de l'état de conscience);
- Signes de mastoïdite (sensibilité, érythème, rougeur/chaleur fluctuante ou masse rétro auriculaire, décollement du pavillon) à l'évaluation du conduit auditif externe;
- Perforation tympanique non résolue après 6 semaines;
- Immunosuppression (ex. : VIH, cancer actif, greffe, prise de médicaments immunosuppresseurs, antinéoplasiques, corticostéroïdes oraux chroniques);
- Utilisation d'antibiotique(s) dans les 30 derniers jours pour la même indication;
- Notion d'allergies à tous les médicaments pouvant être prescrits;
- Grossesse.

## PROTOCOLE MÉDICAL

### 1. Directives à l'infirmière

- Effectue l'évaluation de la condition clinique de l'enfant :
  - Raison de consultation;
  - Questionnaire ciblé :
    - ATCD médicaux dont les allergies, les habitudes alimentaires, l'irritabilité, l'exposition à la fumée secondaire, la vaccination, la fréquentation de la garderie, l'hospitalisation récente, les contacts infectieux, la prise de médication et les habitudes de vie en lien avec la raison de consultation;
    - ATCD d'OMA, veuillez noter la (les) date(s) et traitement(s) utilisé(s);
    - Signes et symptômes d'OMA présents chez l'enfant (PQRSTU).
  - Examen clinique pertinent :
    - Pesée de l'enfant;
    - Évaluation de l'état général;
    - Évaluation de l'état d'hydratation;
    - Évaluation des signes vitaux selon le jugement clinique (FR, FC, TA et température);
    - Évaluation du système oto-rhino-laryngologique (s'il y a une obstruction du conduit auditif par du cérumen, procéder au nettoyage de l'oreille en se référant à la technique de soins du MSI : examen de l'oreille);
    - Évaluation de la région cervicale (à la recherche d'adénopathie/masse/rougeur).
- Initie l'ordonnance collective si l'enfant répond aux critères d'initiation et s'assure de l'absence de contre(s)-indication(s);
- Documente au dossier les informations cliniques pertinentes et les interventions posées, dont l'initiation de l'ordonnance collective, le rapport donné, les informations transmises ainsi que l'enseignement réalisé.

## 2. Traitement pharmacologique

Référez-vous à la fiche de l'INESSS au lien suivant :

<https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/CDM/UsageOptimal/Guides-serie/Guide-Otite-Enfant.pdf>

### ENSEIGNEMENT ET INTERVENTIONS PRÉVENTIVES

L'infirmière :

- Transmets l'information nécessaire sur le traitement pharmacologique si celui-ci est amorcé :
  - Explique les effets secondaires possibles associés au traitement initié;
  - Explique l'importance de compléter le traitement antibiotique pour sa durée totale malgré la résolution des symptômes.
- Transmets l'information nécessaire sur les interventions préventives :
  - Encourage l'allaitement maternel exclusif jusqu'à l'âge d'au moins 6 mois;
  - Explique d'éviter de donner le biberon en position couchée de façon prolongée;
  - Encourage la réduction ou l'arrêt de l'utilisation de la sucette;
  - Conseille l'éradication du tabagisme à la maison, réfère au centre d'abandon tabagique au besoin;
  - Recommande dès le début des symptômes d'IVRS, l'hygiène nasale adaptée à l'âge de l'enfant;
  - Promeut la vaccination selon le PIQ;
  - Conseille, si présence de douleur, la prise d'acétaminophène (Tylenol<sup>MD</sup>, Tempra<sup>MD</sup>) en première intention, ou d'ibuprofène (Advil<sup>MD</sup>, Motrin<sup>MD</sup>) selon la posologie recommandée. L'ibuprofène est non recommandé chez les enfants âgés de moins de 6 mois.

### LIMITES OU SITUATIONS EXIGEANT UNE CONSULTATION MÉDICALE OBLIGATOIRE

À tout moment, avant, pendant ou après l'initiation de la présente ordonnance collective, l'enfant doit être dirigé vers un médecin ou une IPSPL si :

- Présence de contre(s)-indication(s);
- Otorrhée ou si l'hyperthermie persiste malgré plus de 72 h de traitement;
- Absence d'amélioration des symptômes malgré 72h de traitement antibiotique;
- Aggravation des symptômes après 24-48 heures;
- Persistance des symptômes malgré la prise complète du traitement antibiotique;
- Présence de perforation tympanique non résolue après 6 semaines d'un épisode d'otite;
- Persistance d'épanchement séreux après 3 mois d'un épisode d'otite;
- À tout moment selon le jugement clinique du professionnel habilité;
- Convulsions fébriles;
- Paralysie faciale;
- Plus de 4 épisodes d'OMA en 6 mois ou 6 épisodes et plus dans l'année;
- Déshydratation.

### COMMUNICATION AVEC LE MÉDECIN TRAITANT

L'infirmière doit diriger vers l'IPSPL ou vers le médecin répondant dans certaines situations. Il est important de noter que la décision ou l'action nécessaire en dehors du champ d'exercice de l'IPSPL, cette dernière aura la responsabilité de contacter un médecin identifié selon la trajectoire (GAP, GMF-U, GMF intra-muros, GMF extra-muros).

### OUTILS DE RÉFÉRENCE ET SOURCES

Clinique CMIE (2019). *Ordonnance collective pour les professionnels autorisés et/ou affiliés au CMIE, otalgie oreille moyenne*. Repéré à : [https://www.clinique-cmie.com/wp-content/uploads/2019/06/OC\\_Otalgie\\_oreille\\_moyenne.pdf](https://www.clinique-cmie.com/wp-content/uploads/2019/06/OC_Otalgie_oreille_moyenne.pdf)

CHU Sainte-Justine (2018). *L'hygiène nasale*. Repéré à [https://www.chusj.org/getmedia/d81f7af6-a93c-4e86-9011-f523e13279a8/depliant\\_F-886\\_hygiene-nasale.pdf.aspx?ico=.pdf](https://www.chusj.org/getmedia/d81f7af6-a93c-4e86-9011-f523e13279a8/depliant_F-886_hygiene-nasale.pdf.aspx?ico=.pdf)

CHU Sainte-Justine (2021). *cefTRIAXone*. Repéré à <https://www.chusj.org/fr/soins-services/P/Pharmacie/Outils/Guide-Pratique/Medicaments/C/CefTRIAXone>

Urgence CHUSJ (2018). *Otite Moyenne Aiguë*. Repéré à <http://www.urgencehsj.ca/protocoles/otite-moyenne-aigue/>

INESSS (2016). *Otite moyenne aiguë (OMA) chez l'enfant de 3 mois et plus*. Repéré à <https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/CDM/UsageOptimal/Guides-serie/Guide-Otite-Enfant.pdf>

INESSS (2017). *Outil d'aide à la décision en cas d'allergie aux pénicillines*. Repéré à [https://rx.vigilance.ca/module/docproform/docs/inesss\\_aide\\_decision.pdf](https://rx.vigilance.ca/module/docproform/docs/inesss_aide_decision.pdf)

Société canadienne de pédiatrie (2022). *La prise en charge de l'otite moyenne aiguë chez les enfants de six mois et plus*. Repéré à <https://cps.ca/fr/documents/position/otite-moyenne-aigue>

Turgeon et al. (2019). Dictionnaire de pédiatrie WEBER. (3e éd.) Montréal, QC : Chenelière Éducation.

## IDENTIFICATION DU MÉDECIN PRESCRIPTEUR

Non applicable.

## IDENTIFICATION DU MÉDECIN RÉPONDANT

Dans le service de première ligne, le médecin/IPSPL répondant est le médecin/IPSPL qui est de garde ou présent dans le service.

## PROCESSUS DE MISE EN VIGUEUR

### 1. ÉLABORATION DE LA VERSION ACTUELLE

Yuliana Bayona, IPSPL, CLSC Lamater

Pamela O'Connell-Chrétien, IPSPL, GMF Polyclinique médicale Pierre-Le Gardeur

### 2. VALIDATION DE LA VERSION ACTUELLE

Caroline Blouin, conseillère cadre en soins infirmiers


Comité des ordonnances collectives interdisciplinaire (COCI)

Dr Samuel Boudreault, médecin de famille, GMF-U Nord de Lanaudière

Comité de pharmacologie du CISSS de Lanaudière

### 3. APPROBATION DE LA VERSION ACTUELLE

#### REPRÉSENTANT DU CMDP (EN ÉTABLISSEMENT)

| Nom et prénom   | Signature   | Date      |
|-----------------|---|-----------|
| Ouellet, Jérôme |  | 2023-7-18 |

## MÉDECINS SIGNATAIRES (HORS ÉTABLISSEMENT)

Le ou les médecins signataires sont les médecins qui adhèrent à l'ordonnance collective et qui, de ce fait, donnent leur approbation et permettent à un professionnel ou à une personne habilitée d'exercer une activité professionnelle auprès des patients visés par l'ordonnance. Hors établissement, la signature des médecins signataires est requise l'approbation de la version actuelle de l'ordonnance, sauf dans le cas d'un GMF lié à un établissement, alors seule la signature du représentant du CMDP de l'établissement est requise.

| Nom et prénom                | Numéro de permis | Signature | Téléphone | Télécopieur |
|------------------------------|------------------|-----------|-----------|-------------|
| Dre Lydie Tchuissepa         | 19-113           |           |           |             |
| Dre Rosaria Tanferna         | 90-199           |           |           |             |
| Dr Marc Adams                | 99-038           |           |           |             |
| Dre Marie-Josée Marceau      | 98-142           |           |           |             |
| Dr Giovanni Pagliarulo       | 01-151           |           |           |             |
| Dre Elise Boyer              | 20-768           |           |           |             |
| Dre Julie Archaubault        | 04-162           |           |           |             |
| Dre Sonia Chaabane           | 99-306           |           |           |             |
| Dr Arnaud Sylvestre          | 20-320           |           |           |             |
| Dre Audrey Halo-Veromeau     | 20-752           |           |           |             |
| Dre Melanie Senecal-Clovaire | 20-753           |           |           |             |
|                              |                  |           |           |             |
|                              |                  |           |           |             |
|                              |                  |           |           |             |
|                              |                  |           |           |             |
|                              |                  |           |           |             |
|                              |                  |           |           |             |

### RÉVISION

Date d'entrée en vigueur : Avril 2024

Date de la dernière révision (si applicable) : Avril 2024

Date prévue de la prochaine révision :

Signature :

Date :



FORMULAIRE DE LIAISON  
OTITE MOYENNE AIGUË ENFANT

Poids : \_\_\_\_\_ Taille : \_\_\_\_\_ Allergie(s) : \_\_\_\_\_

CONTEXTE CLINIQUE

- Otite moyenne aiguë (OMA) chez un enfant de 3 à 6 mois  
 OMA chez un enfant de 6 mois et plus pour lequel l'option de l'observation (retarder l'antibiotique de 48h) est non appropriée selon les critères établis au guide d'usage optimal des antibiotiques produit par l'INESSS, disponible au lien suivant : [www.inesss.qc.ca/outils-cliniques/outils-cliniques/outils-par-type/guides-dusage-optimal/outils/otite.html](http://www.inesss.qc.ca/outils-cliniques/outils-cliniques/outils-par-type/guides-dusage-optimal/outils/otite.html)  
 OMA chez un enfant de 6 mois et plus pour lequel l'observation de 48 heures est écoulée sans amélioration ni aggravation

MÉDICATION

Antibiotiques de 1<sup>ère</sup> intention en absence d'allergie ou si jugé sécuritaire\* malgré la notion d'allergie à un antibiotique de la classe des pénicillines. En l'absence d'une conjonctivite purulente, privilégier l'amoxicilline. Un choix parmi les suivants (INDIQUER LA DURÉE DE TRAITEMENT POUR LES ENFANTS DE 2 ANS ET PLUS) :

|                          |   | Posologie quotidienne  | Doses maximales  | Durée de traitement |   |              |         |
|--------------------------|---|--|--|---------------------|---|--------------|---------|
|                          |   |  |  | Moins de 2 ans      | 2 ans et plus   |              |         |
| <input type="checkbox"/> | Amoxicilline  | 90 mg/kg/jour PO ÷ BID   | 2000 mg PO BID   | 10 jours            | <input type="checkbox"/> Non sévère : 7 jours<br><input type="checkbox"/> Sévère : 10 jours |              |         |
| <input type="checkbox"/> | Amoxicilline-clavulanate (formulation 7 : 1)<br>Ou<br>Amoxicilline + Amoxicilline-clavulanate (formulation 7 : 1) | 90 mg/kg/jour PO ÷ BID<br><br>Ou<br>45 mg/kg/jour PO ÷ BID +<br>45 mg/kg/jour PO ÷ BID | 1500 mg PO BID<br><br>Ou<br>750 mg PO BID +<br>750 mg PO BID | 10 jours            | <input type="checkbox"/> Non sévère : 7 jours<br><input type="checkbox"/> Sévère : 10 jours |              |         |
|                          | <input type="checkbox"/>  | Ceftriaxone (seulement si prise orale impossible)                                      | 50 mg/kg/jour, IM ou IV                                      |                     |   | 1000 mg/dose | 3 jours |

Alternatives si notion d'allergie à un antibiotique de la classe des pénicillines.

Un choix\* parmi les suivants (INDIQUER LA DURÉE DE TRAITEMENT POUR LES ENFANTS DE 2 ANS ET PLUS) :

|                          |                    | Posologie quotidienne                                | Doses maximales                            | Durée de traitement |   |
|--------------------------|--------------------|--|--|---------------------|---|
|                          |                    |  |  | Moins de 2 ans      | 2 ans et plus   |
| <input type="checkbox"/> | Cefprozil          | 30 mg/kg/jour PO ÷ BID                               | 500 mg PO BID                              | 10 jours            | <input type="checkbox"/> Non sévère : 7 jours<br><input type="checkbox"/> Sévère : 10 jours |
| <input type="checkbox"/> | Céfuroxime axétile |  |  |                     |   |
| <input type="checkbox"/> | Azithromycine      | 10 mg/kg PO DIE le jour 1,<br>5 mg/kg PO DIE x jours | 500 mg po DIE le jour 1 puis 250 mg po DIE | 5 jours             |   |
| <input type="checkbox"/> | Clarithromycine    | 15 mg/kg/jour PO ÷ BID                               | 500 mg PO BID                              | 10 jours            | 7 jours   |

\*Selon l'algorithme décisionnel disponible au : [www.inesss.qc.ca/outils-cliniques/outils-cliniques/outils-par-type/guides-dusage-optimal/outils/otite.html](http://www.inesss.qc.ca/outils-cliniques/outils-cliniques/outils-par-type/guides-dusage-optimal/outils/otite.html)

Signature : \_\_\_\_\_ Date / heure \_\_\_\_\_  
 aaaa/mm/jj hh:mm

FORMULAIRE DE LIAISON  
OTITE MOYENNE AIGUË ENFANT

Dossier médical  
D.I.C.: 3-4-4  
Page 1 de 2

Nom :

Prénom :

# Dossier :

**TRANSMISSION DU FORMULAIRE**

Ce formulaire représente l'original et ne sera pas réutilisé. La pharmacie identifiée est le seul destinataire.

Transmis par télécopieur à la pharmacie communautaire de l'utilisateur.

Cordonnées de la pharmacie communautaire :

Nom : \_\_\_\_\_

Téléphone : ( ) \_\_\_\_\_

Fax : ( ) \_\_\_\_\_

**CONTEXTE D'UTILISATION DE LA PRÉSENTE ORDONNANCE**

Médecin traitant

Via l'OC CISSSL 62 : Initier un traitement chez les enfants présentant des signes et symptômes suggestifs d'otite moyenne aiguë (OMA)

Médecin ou IPSPL répondant : Dr \_\_\_\_\_ (# \_\_\_\_\_)

(ou tout autre médecin Téléphone : (\_\_\_\_\_) \_\_\_\_\_)

ou IPSPL qui remplace Fax : (\_\_\_\_\_) \_\_\_\_\_

en son absence) Adresse postale : \_\_\_\_\_

**PROFESSIONNEL HABILITÉ :**

Nom (# licence) : \_\_\_\_\_ (# \_\_\_\_\_)

Téléphone : ( ) \_\_\_\_\_

Fax : ( ) \_\_\_\_\_

Adresse postale : \_\_\_\_\_

Signature : \_\_\_\_\_ Date / heure \_\_\_\_\_

aaaa/mm/jj hh:mm

( )

**FORMULAIRE DE LIAISON  
OTITE MOYENNE AIGUË ENFANT |**

Dossier médical  
D.I.C.: 3-4-4  
Page 2 de 2

