

ORDONNANCE COLLECTIVE

Initier ou cesser la fluticasone (Flovent) topique lors d'une réaction inflammatoire due à un timbre transdermique

Établissement : CISSS de Lanaudière

Numéro de l'ordonnance collective : OC CISSS de Lanaudière 27

Période de validité : 3 ans (août 2023)

SITUATION CLINIQUE

Présence d'une réaction cutanée inflammatoire légère à modérée au site d'application du timbre transdermique chez les usagers du CISSS de Lanaudière.

PROFESSIONNELS AUTORISÉS

- Personnel infirmier œuvrant au CISSS de Lanaudière;
- Inhalothérapeutes œuvrant au CISSS de Lanaudière;
- Pharmacien(ne)s œuvrant au CISSS de Lanaudière.

ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES VISÉES

Activités réservées au personnel infirmier :

- Évaluer la condition physique et mentale d'une personne symptomatique;
- Initier des mesures diagnostiques et thérapeutiques selon une ordonnance;
- Administrer et ajuster des médicaments ou d'autres substances, lorsqu'ils font l'objet d'une ordonnance.

Activité réservée à l'inhalothérapeute :

- Administrer et ajuster des médicaments ou d'autres substances, lorsqu'ils font l'objet d'une ordonnance.

Activités réservées au pharmacien(ne) :

- Prescrire un médicament lorsque aucun diagnostic n'est requis, notamment à des fins préventives;
- Initier ou ajuster, selon une ordonnance, la thérapie médicamenteuse en recourant, le cas échéant, aux analyses de laboratoire appropriées;
- Surveiller la thérapie médicamenteuse.

INDICATIONS

Réaction cutanée inflammatoire légère à modérée persistante au niveau de la peau, nettement délimitée sous le site d'application du timbre transdermique. La réaction persiste malgré l'utilisation adéquate des timbres (rotation des sites, application sur peau intacte, etc.).

INTENTION THÉRAPEUTIQUE

Diminuer et/ou enrayer l'inconfort secondaire au timbre transdermique tout en favorisant l'adhésion de l'utilisateur à son traitement.

CONTRE-INDICATION

Hypersensibilité à la fluticasone ou à l'une des composantes du produit (HFA-134a/1,1,1,2-tétrafluoroéthane).

PROTOCOLE MÉDICAL

1. DIRECTIVES

- Évaluer si présence de signes et symptômes suggestifs d'une réaction inflammatoire légère à modérée associés à de l'inconfort.
 - La réaction inflammatoire persistante légère à modérée se manifeste par une ou plusieurs des façons suivantes :
 - Prurit;
 - Sensibilité;
 - Érythème;
 - Brûlure;
 - Papule(s).
 - La réaction inflammatoire est limitée au site d'application du timbre.
 - L'utilisateur exprime verbalement un inconfort ou démontre des signes d'inconfort qui se manifestent et/ou persistent au-delà d'une heure post-application du timbre ou relate avoir retiré le timbre ou changé le site d'application du timbre au courant d'une même journée en raison d'un inconfort.
- Documenter au dossier les informations cliniques pertinentes et les interventions posées;
- Compléter le formulaire de liaison (voir Annexe 1).

2. TRAITEMENT PHARMACOLOGIQUE

Fluticasone (Flovent) 125 mcg/vaporisation à raison d'une vaporisation avant chaque application de timbre, au site de ce dernier. La peau doit être sèche avant d'appliquer le timbre transdermique.

Valide pour toute la durée de traitement de la thérapie transdermique, pour une durée maximale de 12 mois.

3. ENSEIGNEMENT

Clientèle admise, hospitalisée ou hébergée

Le personnel infirmier qui administre la fluticasone topique doit se référer aux conseils présentés à la section « Clientèle ambulatoire » afin d'adopter la technique adéquate.

Clientèle ambulatoire

Prévoir les conseils suivants et s'assurer de leur compréhension par l'utilisateur (ou son proche aidant) avant l'initiation de la présente ordonnance collective :

- Agiter la pompe de fluticasone avant emploi;
- Vaporiser sur une peau intègre, propre, sèche et dépourvue de poils (après la sortie du bain chaud ou de la douche chaude : attendre 5 minutes avant la vaporisation de fluticasone);
- Vaporiser entre 15 et 20 centimètres de distance de la peau où sera appliqué le timbre transdermique;
- Vaporiser avant chaque application du timbre;
- Appliquer le timbre une fois la peau sèche après la vaporisation, afin de permettre préalablement l'absorption topique de fluticasone.

4. SUIVI

Clientèle admise, hospitalisée ou hébergée

Le suivi de l'efficacité et de l'innocuité est effectué 3 à 7 jours après le début de traitement, puis selon l'évolution.

Le personnel infirmier est responsable du suivi; celui-ci doit être prévu au plan thérapeutique infirmier (PTI) et une fois réalisé, documenté dans les notes infirmières du dossier médical de l'utilisateur.

Si pour quelque motif que ce soit, le traitement doit être cessé, le formulaire de liaison (voir Annexe 1) doit être transmis au département de pharmacie du CISSS de Lanaudière pour ajustement de la feuille d'administration des médicaments (FADM) en conséquence.

Clientèle ambulatoire

Le suivi de l'efficacité et de l'innocuité est effectué 3 à 7 jours après le début de traitement.

Le suivi peut être :

- Délégué à l'utilisateur ; c'est-à-dire que l'utilisateur doit lui-même contacter le professionnel de la santé désigné au formulaire de liaison (voir Annexe 1);
- Effectué par le professionnel de la santé ayant lui-même initié l'ordonnance collective ou à un professionnel de la santé de son équipe désigné et habilité en son absence;
- Délégué à un autre professionnel de la santé, désigné sur le formulaire de liaison (voir Annexe 1), tels que les pharmaciens de la pharmacie communautaire de l'utilisateur ou les professionnels de la santé œuvrant au Centre d'Abandon du Tabac (CAT) de la région, par exemple.

Le suivi effectué doit être documenté au dossier de l'utilisateur, que ce soit à son dossier médical et/ou pharmacologique (idéalement les deux).

Si pour quelque motif que ce soit, le traitement doit être cessé, le formulaire de liaison (voir Annexe 1) doit être transmis à la pharmacie communautaire de l'utilisateur pour l'en informer.

LIMITES OU SITUATIONS EXIGEANT UNE CONSULTATION MÉDICALE OBLIGATOIRE

- Réaction inflammatoire sévère (vésicules, desquamation, érosion);
- Présence de signes et symptômes d'infection (érosion, enflure, pustules, abcès, peau d'orange, pourtours mal délimités, fièvre);
- Aucune amélioration ou progression de la réaction inflammatoire après une semaine de traitement aux différents sites d'application du timbre transdermique.

COMMUNICATION AVEC LE MÉDECIN TRAITANT

Non applicable – voir section médecin répondant.

OUTILS DE RÉFÉRENCE ET SOURCES

Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière. (2014, janvier). *Ordonnance collective « Initier l'application de fluticasone (Flovent) lors d'une réaction inflammatoire suite à l'application du timbre transdermique de Rivastigmine (Exelon) »*. Disponible sur l'intranet du CISSS de Lanaudière.

Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière. (Repéré le 2 février 2017 sur l'Intranet du CISSS du Nord de Lanaudière). *MSI : Application de timbres transdermiques*.

Musel, AL. et Warshaw, EM. (2006, august 31). *Cutaneous reactions to transdermal therapeutic systems*. 17(3) :109-122.

Ordre des pharmaciens du Québec. (2009). Cessation tabagique, une formation qui fait mouche. Mise à jour – Deuxième volet, *La pharmacothérapie de la dépendance au tabac*. 16 pages.

Thériault, A. (2007). Cesser de fumer, qu'a-t-on en pharmacie ? *Québec Pharmacie*, 54(5), 21-25.

IDENTIFICATION DU MÉDECIN SIGNATAIRE

La présente ordonnance collective est entérinée par D^r Jérôme Olivier (n^o 102237), président du CMDP.

IDENTIFICATION DU MÉDECIN RÉPONDANT

En établissement (usagers hospitalisés, hébergés, admis, à l'urgence), le médecin répondant est le médecin traitant ou, en l'absence de celui-ci, le médecin présent au service ou le médecin de garde assigné.

Pour la clientèle ambulatoire qui consulte en clinique externe, en médecine de jour, aux services de soins primaires ou autres points de services, le médecin répondant est le médecin qui a prescrit le timbre qui cause la réaction inflammatoire.

PROCESSUS DE MISE EN VIGUEUR

1. ÉLABORATION DE LA VERSION ACTUELLE

Johannie Beaucage Charron, pharmacienne
Michelle Blanchet, infirmière clinicienne, conseillère cadre
Julie Chagnon, infirmière clinicienne
Réjean Duchesne, inhalothérapeute, chef de service des activités respiratoires
Roxanne Forget, pharmacienne
D^r Laurent Marcoux, santé publique et médecine préventive
Sarah Monette, agente de planification, de programmation et de recherche
Nadia Perreault, directrice adjointe des soins infirmiers

2. VALIDATION DE LA VERSION ACTUELLE

Comité MOAT du CISSS de Lanaudière
Comité des ordonnances collectives interdisciplinaire (COCI) du CISSS de Lanaudière
Comité de pharmacologie du CISSS de Lanaudière

3. APPROBATION DE LA VERSION ACTUELLE REPRÉSENTANT DU CMDP (EN ÉTABLISSEMENT)

Nom et prénom	Signature	Date
Olivier, Jérôme		20 octobre 2020

4. RÉVISION

Date d'entrée en vigueur : _____
a a a a / m m / j j

Date de la dernière révision (si applicable) : _____
a a a a / m m / j j

Date prévue de la prochaine révision : _____
a a a a / m m / j j

Signature du médecin répondant (si applicable) : _____
a a a a / m m / j j

Signature : _____ Date : _____
a a a a / m m / j j



Annexe 1 : Formulaire de liaison « Fluticasone topique »

Centre intégré
de santé
et de services sociaux
de Lanaudière

Québec



FORMULAIRE DE LIAISON : FLUTICASONE TOPIQUE

Ordonnance collective n° 27 : Initier ou cesser l'application de fluticasone (Flovent) topique lors d'une réaction inflammatoire due à un timbre transdermique

TRANSMISSION DU FORMULAIRE

Ce formulaire représente la copie originale. La pharmacie identifiée est le seul destinataire. Il ne sera pas réutilisé.

Département de pharmacie du CISSS de Lanaudière

Pharmacie communautaire

Téléphone : () _____

Télécopieur : () _____

Remis à l'utilisateur : Oui Non

ÉVALUATION

Cocher toutes les cases qui décrivent le mieux la situation actuelle :

L'utilisateur répond aux critères de l'OC 27 ET ne présente aucune contre-indication.

L'utilisateur doit être référé à un médecin pour la raison suivante :

Réaction inflammatoire sévère

Signes et/ou symptômes d'infection

Aucune amélioration ou progression de la réaction inflammatoire après une semaine de traitement aux différents sites d'application du timbre transdermique.

Autre raison : _____

ORDONNANCE

Je recommande la thérapie suivante :

Fluticasone (Flovent) 125 mcg/vaporisation à raison d'une vaporisation avec l'application du timbre transdermique, au site d'application de ce dernier. La peau doit être sèche avant d'appliquer le timbre. La thérapie est valide pendant la durée de traitement du timbre ou tout au plus 12 mois.

Je cesse la fluticasone topique.

ENSEIGNEMENT ET SUIVI

Les informations relatives à l'emploi du produit ont été transmises à l'utilisateur ou à son proche aidant.

L'utilisateur ou son proche aidant comprend ces informations.

Le suivi sera effectué au plus tard une semaine après le début du traitement par :

L'utilisateur lui-même Le CAT de Lanaudière Le prescripteur Autre : _____

J'ai remis à l'utilisateur les coordonnées du responsable du suivi, le cas échéant.

IDENTIFICATION DU PROFESSIONNEL HABILITÉ VISÉ PAR L'ORDONNANCE COLLECTIVE n° 27

Nom, Prénom : _____ Numéro de pratique : _____

Téléphone : () _____ Date : _____

aaaa/mm/jj

Signature : _____

IDENTIFICATION DU MÉDECIN SIGNATAIRE

D^r Jérôme Olivier (n° 102237) président du CMDP du CISSS de Lanaudière

LN2249 (2020-09-02)

FORMULAIRE DE LIAISON :
FLUTICASONE TOPIQUE

Dossier médical
D.I.C.: 3-4-4
Page 1 de 1